

XAVENTIN

INFORMATIONS À L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR Xaventin comprimés

1. Qu'est-ce que Xaventin comprimés ?

Xaventin comprimés est un produit naturel, un complément alimentaire sans matière grasse qui est une source de protéines pour favoriser le maintien de la masse musculaire.

2. Quel est le principe actif de Xaventin comprimés ?

10 comprimés de Xaventin comprimés contiennent 7,4 grammes de Xaventin pulvis, un extrait résultant d'une technologie pharmaceutique spéciale, brevetée. Le germe de blé n'en est que la matière première.

3. Xaventin comprimés contient-il des édulcorants, des arômes ou des sucres ajoutés ?

Il n'en contient pas.

4. Quand peut-on commencer à utiliser Xaventin ?

La prise de Xaventin peut être démarrée à tout moment, pour autant que les contre-indications soient respectées. Il est conseillé de demander l'avis de votre médecin avant de prendre Xaventin afin d'en retirer un meilleur bénéfice.

5. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Xaventin ?

Il n'y a aucune contre-indication à consommer Xaventin lors de traitements oncologiques cliniques (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie etc.). Xaventin ne doit pas être utilisé comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée ni d'un mode de vie sain.

6. Comment faut-il prendre Xaventin ?

Il est préférable de prendre Xaventin sans interruption. Xaventin peut être pris pendant une période illimitée. Si la prise de Xaventin a été arrêtée ou suspendue (quelle qu'en soit la raison), il est possible de la recommencer à tout moment.

7. Dans quel cas Xaventin ne peut-il pas être utilisé ?

Xaventin ne peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Xaventin est contre-indiqué pour les patients ayant subi une greffe de tissu ou une transplantation d'organes.

Le produit est contre-indiqué chez les personnes très sensibles au gluten (maladie cœliaque). Le produit est également contre-indiqué pour les patients souffrant d'intolérance héréditaire au fructose ou d'une hypersensibilité à l'un des composants et ingrédients du produit.

8. Les diabétiques peuvent-ils prendre Xaventin ?

Oui, car Xaventin comprimés est pauvre en sucres (3,6 g/10 comprimés).

9. Quand faut-il suspendre temporairement le traitement par Xaventin ?

Il est conseillé de suspendre la prise de Xaventin 2 jours

avant des examens cliniques au cours desquels un produit de contraste est introduit dans le tube digestif (par exemple: les examens de radio-diagnostic du tube digestif avec un produit de contraste à base de sulfate de baryum). Le jour suivant l'examen, le traitement par Xaventin peut être recommencé. Dans tous les cas, il est préférable de consulter votre médecin. S'il est demandé au patient de rester à jeun pour l'examen, il sera également conseillé de ne pas prendre Xaventin.

10. Les enfants peuvent-ils prendre Xaventin ?

Xaventin peut être consommé dès 14 ans. Il est préférable de consulter votre médecin avant de le donner à votre enfant.

11. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Xaventin est susceptible de provoquer des effets indésirables, bien que chacun n'y soit pas sensible de la même manière. Il existe une possibilité qu'apparaissent de légers troubles digestifs: selles plus molles, estomac dérangé, nausées.

12. Xaventin peut-il être pris avec d'autres médicaments, d'autres produits ?

Oui. Cependant, il faut observer un délai de 2 heures entre la prise de Xaventin et celle de vitamine C ou d'autres produits contenant de la vitamine C. Il est conseillé de ne prendre aucun autre médicament ou produit en même temps que Xaventin comprimés.

13. Quelle est la quantité journalière recommandée ? À quel moment faut-il prendre Xaventin ?

- Pour les personnes dont le poids corporel est inférieur à 50 kg : 8 comprimés par jour qui peuvent être répartis en 2 prises, soit 4 comprimés 2 fois par jour.
- Pour les personnes dont le poids corporel est entre 50 kg et 90 kg : 10 comprimés par jour qui peuvent être répartis en 2 prises, soit 5 comprimés 2 fois par jour.
- Pour les personnes dont le poids corporel est supérieur à 90 kg : 14 comprimés par jour qui peuvent être répartis en 2 prises, soit 7 comprimés 2 fois par jour.

Il est préférable de répartir la doses journalière en 2 prises: matin et soir.

15. Comment faut-il conserver et livrer Xaventin ?

Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais (inférieur à 22° C), comme le réfrigérateur (pas besoin de congélateur). Tenir Xaventin hors de portée des enfants. Éviter d'exposer Xaventin comprimés à une chaleur excessive pendant la livraison.

Boîte de 150 comprimés de 1040 mg
Poids net: 156 g (150 X 1,04 g)

Distributeur exclusif Luxembourg et France :

NATURA *Medicatrix* sàrl, 8, Hannert dem Duaref, L-9772 Troine (Wincrange), Luxembourg
Tél. : 00.352.20.88.11.95 (lu) / 03.66.88.02.34 (fr)
www.naturamedicatrix.lu
info.naturamedicatrix.eu

Fabricant :

BIOPHARMA, First Hungarian Biotechnological Ltd.
H-6413 Kunfehértó, Hungary.