

Valeurs moyennes Gemiddelde waarden	1x1,5 ml**	2x1,5 ml***
Choline	125 mg	250 mg
Vitamine B <sub>1</sub>	0,41 mg (38%*)	0,83 mg (75%*)
Vitamine B <sub>2</sub>	0,53 mg (38%*)	1,1 mg (75%*)
Niacine	4 mg NE (25%*)	8 mg NE (50%*)
Vitamine B <sub>6</sub>	0,25 mg (18%*)	0,5 mg (36%*)
Vitamine B <sub>12</sub>	1,25 µg (50%*)	2,5 µg (100%*)

**Choline:** contribue à une fonction hépatique<sup>1</sup> normale, ainsi qu'à un métabolisme lipidique normal.-draagt bij tot een normale leverfunctie<sup>1</sup> en een normale vetstofwisseling.

**Vitamine B<sub>1</sub>:** contribue à une fonction cardiaque normale<sup>2</sup>, au fonctionnement normal du système nerveux et à un métabolisme énergétique normal<sup>3</sup>. – draagt bij tot een normale hartfunctie<sup>2</sup>, een normale functie van het zenuwstelsel, en een normale energiestofwisseling<sup>3</sup>.

**Vitamines/vitamines B<sub>2</sub>, B<sub>6</sub> et B<sub>12</sub>:** participent à la réduction de la fatigue.- draagt bij tot de vermindering van de vermoeidheid.

**Ingrédients/ Ingrediënten :** acide lactique L (+)/l-(+)-melkzuur (verzurend) (acidifiant) (40%), eau/ water, citrate hydrogéné de choline/choline waterstofcitrate (20%), glycosides de stéviol/steviol glycosiden (édulcorant/zoetmiddel), nicotinamide, chlorhydrate de thiamine/thiamine-waterstofchloride, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine/pyridoxine-waterstofchloride, cyanocobalamine.



\*Apports quotidiens de référence. **Dagelijkse referentie-innames.** \*\*1 portion/portie ; \*\*\*2 portions (dose quotidienne)/2 porties (dagdos). NE = Niacin equivalent.



# Lactacholine

Choline et vitamines B  
Cholin en vitaminen B

Foie<sup>1</sup>, Coeur<sup>2</sup>, Energie<sup>3</sup>

Lever<sup>1</sup>, Hart<sup>2</sup>, Energie<sup>3</sup>

100 ml e



Dr. Jacob's®

66 portions  
porties

## Ne jamais consommer pur ! Nooit puur verbruiken !

**Conseils d'utilisation :** 1,5 ml 1 à 2x/jour dans 300 ml d'eau, de préférence avec la Formule Alcalinisante. A boire de préférence au repas. Ne pas utiliser sur un estomac sensible à l'acidité. Bien agiter avant emploi / **Aanbevolen gebruik :** 1,5 ml 1-2 keer dagelijks in 300 ml water, het liefst in combinatie met de Ontzurende Formule. Het liefst tijdens de maaltijd drinken. Niet op een zuurgevoelige maag gebruiken. Goed schudden voor gebruik.

Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne devraient pas être utilisés comme substituts à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain / De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten bereik van de kinderen bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.

**Distributeur exclusif/Exclusieve verdeler Be :** NATURA Medicatrix srl,

22, route des Fagnes, B-4190 Ferrières, Belgique

Tel. : 00 32 (0)2 808 13 51- info@naturamedicatrix.be

**Distributeur exclusif/Exclusieve verdeler Fr/Lux :** NATURA Medicatrix sàrl,

8, Hannert dem Duarref - L-9772 Troine (Wintrange), Luxembourg.

Tel. : 00 352 20 88 11 95 (lu) / 09.77.42.37.04 (fr)

Avec de l'acide lactique provenant des Pays-Bas  
Met melkzuur uit Nederland.

## Fabriqué par – vervaardigd door :

Dr. Jacob's Medical GmbH, 92, Platter Str.  
D-65232 Taunusstein, Allemagne/Duitsland.

Complément alimentaire / Voedingssupplement

Avec édulcorant d'origine naturelle provenant  
de la stévia / Met zoetmiddel uit de steviaplant

NUT/AS : 979/19

CNK 3017-381



3017-381



4 041246 1500707

SANS LACTOSE/ ZONDER LACTOSE

www.naturamedicatrix.eu

191024D